



MEETING:

een date met meeropbrengst

RASBESCHRIJVING

Registratie Nationale rassenlijst 2012,
Ter opname op de Aanbevelende Rassenlijst 2013.

Meeting is een nieuw ras dat **vroeg** afrijpt in het segment 'overige tarwe'. Het ras beschikt over een **zeer breed resistentie spectrum waarbij de resistentie tegen fusarium uitstekend is**. Deze combinatie zorgt voor een **zeer uitstekende opbrengst potentieel** wat vooral tot expressie komt in kleigrond. Het ras heeft een zeer goede recovery na de winterperiode.

OPBRENGST

Meeting laat zeer hoge stabiele opbrengsten zien, met name in de lichte tot zwaardere klei gronden Het ras is ook zeer geschikt voor de Centrale en noordelijke regio's vanwege de vroege afrijping en de fusarium resistentie.

| | Opbrengst |
|---------------------------|-----------|
| Noordelijke zeeklei | 101 |
| Centrale zeeklei | 101 |
| Zuidwestelijke zeeklei | 100 |
| Rivierklei en löss | 100 |
| Zand- en dalgronden | 96 |



KWALITEIT

- Biscuit tarwe, goede testresultaten uit de biscuittest van de CTCPA.
- Zachte tarwe (60-90 met 11% proteïnes) en P/L tussen 0,2-0,3
- Goed hectoliter gewicht

LANDBOUWKUNDIGE EIGENSCHAPPEN

- voldoende vorstresistentie, zeer sterke recovery met sterke uitstoeling.
- Vroege afrijping van de aar
- Kort stro type
- Zeer goede resistentie tegen bladvlekkenziekte en bruine roest
- Goede resistentie tegen Fusarium
- Matige resistentie tegen Meeldauw en Schot
- Dorst goed

Gezonde tarweteelt

| | | | |
|---------------|-----|--------------------|-----|
| Lengte stro | 90 | Fusarium in de aar | 7.0 |
| Stevigheid | 6.5 | Bladvlekkenziekte | 7.5 |
| Vroegheid aar | 7.0 | Meeldauw | 7.5 |
| Vroegrijpheid | 6.5 | Bruine roest | 8.5 |
| | | Gele roest | 7.5 |
| | | Schot | 6.0 |

CSAR onderzoek 2013: gemiddelde resultaten over de jaren 2009-2013 uitgevoerd door PPO Lelystad

TEELT

Meeting kan geteeld worden volgens de gangbare teeltmethoden. Laat u hierover informeren door uw leverancier. Enkele opmerkingen:

- Het ras stoelt zeer goed uit, waardoor eventuele uitwintering/ dunne stand goed gecompenseerd wordt. De benodigde hoeveelheid zaaizaad per hectare ligt tussen de 175 en 190 kg per hectare. Bij zwaardere kleigronden en ongunstigere/ later omstandigheden is het verstandig de zaai dichtheid te verhogen naar 190- 220 kg per hectare.
- Bemesting kan uitgevoerd worden volgens de normale werkwijze.
- Het ras heeft goede ziekteresistenties en kan daardoor op de traditionele wijze behandeld worden door toevoeging van een fungicide aan de groeiregulator, met extra aandacht voor de gele roest.

MEER INFORMATIE

Vraag vrijblijvend naar beschikbaarheid, leveringscondities & vermeerdering

Van de Bilt zaden en vlas bv
Contact: tel. +31 115 471922

www.vandebiltzadenvlas.com
info@vandebiltzadenvlas.com